

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:

54 140 01 0000 00 00	Gyógypedagógiai asszisztens	Gyógypedagógiai asszisztens
----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Tájékoztató

A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!

Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell tüntetnie, és a lapokat sorszámmal kell ellátnia.

Értékelés

Összesen: 100 pont

100% = 100 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 5%.

Az iskolában, ahol Ön dolgozik, a következő hónapban három új tanuló érkezését várják. Mindhárman a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességeivel, azok különböző formáival küzdenek. Kollégáival áttekintik a szükséges teendőket.

Foglalja össze a témakörrel kapcsolatos ismereteit a következők szerint!

1. Mutassa be a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességei közül az alábbi kategóriák lényegét!

(25 pont)

Hiperkinetikus zavarok:

Diszlexia:

Diszgráfia:

A motoros funkciók specifikus fejlődési rendellenességei:

Elektív mutizmus:

2. Párosítsa az alábbi viselkedészavarokat és a hozzájuk tartozó jellemzőket! Írja a betűjeleket a táblázat megfelelő helyére!

(20 pont)

- A. Magatartási zavarok
B. Oppozíciós zavarok
C. Mindkettő
D. Egyik sem

Legjellemzőbb tünete a felnőttekkel való szembeszegülés és a felnőttek kérésének visszautasítása.	
Agressziót, hazugságot, lopást magában foglaló tünetegyüttes.	
Negatív, ellenkező és kihívó viselkedés.	
A tünetek kizárólag családi környezetben jelentkeznek.	
A diszruptív viselkedészavar (fokozott érzelmi állapotra és a viselkedéskontroll hiányára utaló tünetegyüttes) egyik formája.	
Megjelenhet öngyilkossági hajlam és/vagy kísérlet.	
A tünetek leghamarabb 14 éves korban jelentkeznek.	
BNO által leírt tünetegyüttes.	
A tünetek között gyakori az alkohol- és drogfogyasztás.	
Előfordulása minden életkorban gyakoribb a lányoknál.	

3. **Ön és kollégái áttekintik az újonnan érkező gyermekek tanulási képességeit és személyiségállapotát leíró szakvéleményt, illetve az abban szereplő pszichometriai adatokat.**

Párosítsa az alább felsorolt pszichometriai tesztek és rövid meghatározásait! Írja a vizsgálati eszközök betűjelét a megfelelő helyre!

(16 pont)

- a. Pieron-teszt
- b. Peabody-teszt
- c. Bender próba
- d. MAWGYI-R
- e. Goodenough-féle teszt
- f. GMP-teszt
- g. Sindelar-teszt
- h. RAVEN-teszt

___ A vizuomotoros koordináció fejlettségét vizsgáló eljárás

___ Figyelemvizsgáló eljárás

___ A tanulási zavart okozó részképességeket vizsgáló eljárás, melyhez terápiás módszer is kapcsolódik

___ Beszédészlelést és beszédmegértést vizsgáló eljárás

___ A passzív szókinccs szintjét mérő, szókinccsvizsgáló eljárás

___ Az IQ-val rokonságot mutató rajzkvóciens számolására alkalmas emberrajz kiértékelési módszer

___ Intelligenciateszt verbális és performációs próbákkal

___ Nonverbális, analitikus gondolkodást vizsgáló intelligenciateszt

4. **Milyen viselkedési és kommunikációs elvek figyelembe vétele javasolt a pedagógus részére a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességeivel küzdő gyermekek oktatása során? Soroljon fel ezek közül ötöt!**

(15 pont)

5. **Nevezzen meg legalább nyolc játékos tevékenységet, melynek során lehetőség nyílik az alakállandóság (alakkonstancia) fejlesztésére!**

(24 pont)